

2 หลีกเลี่ยงการคลุกคลีหรือสัมผัส
ผู้ป่วย



3 ทำความสะอาดของเล่นเด็ก
เป็นประจำ



4 หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ การที่ได้รับ
ควันบุหรี่จะมีความเสี่ยงสูงที่จะติด
เชื้อไวรัสอาร์เอสวี



5 รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ที่มึมน้ำมากๆ และให้เด็กพักผ่อนให้
เพียงพอ



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
โทร : 044-002102



ไวรัสอาร์เอสวี

(Respiratory Syncytial Virus, RSV)



RSV

คืออะไร ?

Respiratory Syncytial Virus (RSV)



เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนหรือปลายฝนต้นหนาว



การติดต่อ

สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จาม ของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย โดยเชื้อไวรัสอาร์เอสวีสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมงและสามารถอยู่ที่มือของเราได้นานประมาณ 30 นาที

อาการ



• ไข้สูง



• ไอมาก และมีเสมหะมาก
• ซึมลง



• หายใจลำบาก หอบเหนื่อย



• ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจน

การรักษา



ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ ยาแก้ไอละลายเสมหะ ในเด็กบางรายที่มีเสมหะมาก ต้องเจาะปอดและดูดเสมหะออก เพื่อลดความรุนแรงของอาการไอและหายใจหอบเหนื่อยได้ ยาปฏิชีวนะไม่มีประโยชน์หากไม่มีเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน

การป้องกัน



1 หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่

